

Из-за чего у шпица появляется алопеция: факторы и что предпринять

Облысение у шпица — частая проблема, с которой хозяева сталкиваются внезапно: ещё вчера питомец выглядел роскошно, а сегодня на шубке появились проплешины. Существенно понять, что поредение — это не самостоятельное заболевание, а сигнал о нарушениях в организме.

Причины бывают самыми разными: от гормональных сбоев до паразитов. Одни случаи требуют немедленной консультации специалиста, другие поддаются коррекции в домашних условиях, но верное заключение должен дать врач после осмотра и анализов.

Основные причины алопеции у шпицев

Собаки породы шпиц предрасположены к ряду характерным заболеваниям, провоцирующим облысение. Наиболее часто встречаются эндокринные патологии, реакции на аллергены, кожные паразиты и нехватка витаминов. Каждая из перечисленных проблем нуждается в разном подходе к лечению.

Гормональный фон напрямую влияет на состоянии кожи и шерсти. Сбои щитовидной железы, нарушения половых гормонов или патологии надпочечников вызывают равномерному облысению по бокам, на спине и бёдрах. Шубка становится безжизненной, ломается и выпадает.

Не менее важны и внешние воздействия: неправильный корм, эмоциональное напряжение, неподходящие условия и отсутствие регулярного груминга. Шпицы особенно чувствительны к качеству питания и психологическому комфорту.

Каким образом распознать природную линьку от патологии

Многие владельцы смешивают естественную линьку с началом алопеции. Природный процесс происходит дважды в год и длится пару недель. В этом случае покров уходит равномерно по всей площади, без формирования залысин.

Признак	Нормальная линька	Алопеция
Симметричность	Да	Нет
Равномерно по телу	Да	Нет
Локальные залысины	Нет	Да
Состояние кожи	Чистая, без покраснений	Покраснения, шелушение
Зуд	Отсутствует	Часто присутствует
Длительность	2–4 недели	Дольше месяца
Сезонность	Весна и осень	В любое время года

Патологическое выпадение сопровождается сопутствующими признаками: расчёсыванием, покраснением эпидермиса, шелушением, переменами в настроении животного. Когда вы обнаружили хотя бы один из этих признаков, нужно пойти к специалисту.

Эндокринные причины выпадения шерсти

Пониженная функция щитовидной железы — одна из самых частых эндокринных патологий, вызывающих облысение у собак этой породы. Недуг развивается постепенно, проявляется вялостью, набором веса и ухудшением качества шерсти. Диагноз ставится анализом крови на концентрацию тиреоидных гормонов.

Дисбаланс эстрогена и тестостерона также способно вызвать потерю шубки. У нестерилизованных питомцев это нередко обусловлено с заболеваниями яичников или семенников. После диагностики врач может рекомендовать стерилизацию как способ устранения недуга.

- Гипотиреоз и снижение функции щитовидной железы

- Дисбаланс половых гормонов
- Патологии надпочечников и синдром Кушинга
- Сахарный диабет и нарушения обмена веществ

Паразиты и грибковые заболевания

Кожные паразиты доставляют питомцу серьёзный дискомфорт и являются частым причиной алопеции. Непрерывный зуд заставляет собаку расчёсывать кожу до ран, и вызывает появлению проплешин.

Микозные инфекции требуют в особом внимании: лишай распространяется не только на других питомцев, но и может быть опасен для людей. Лечение проводится специальными средствами под наблюдением ветеринара.

Клещевое поражение и саркоптоз проявляются сильным зудом, покраснением и локальным выпадением шерсти. Установление диагноза включает соскоб и микроскопическое исследование.

Аллергии и пищевая непереносимость

Пищевая аллергическая реакция нередко выражается кожными симптомами: зудом, краснотой, выпадением шубки и воспалительным процессом в ушных раковинах. Белок животного происхождения чаще всего выступает виновником аллергии.

Исключающая диета — основной способ диагностики пищевой реакции. Владелец меняет рацион животного на специальный рацион с новым источником протеина и отслеживает изменения в течение нескольких недель.

Атопия или аллергия на укусы блох тоже провоцируют зуд и облысение. Важно убрать все возможные раздражители из окружения собаки.

Питание и витамины

Сбалансированный рацион — залог крепкой шерсти и кожи. Нехватка омега-3 и омега-6, цинка, биотина и витаминов группы В вызывает пересыхание кожи и выпадению шерсти.

Хороший рацион обязан включать необходимое количество белка животного происхождения, жиров и микроэлементов. В случае необходимости ветеринар подберёт витаминные комплексы с учётом личных потребностей животного.

Резкая перемена корма может вызвать не только пищеварительные проблемы, но и ухудшение качества шубки. Переход собаку на новый корм плавно, на протяжении 7–10 дней.

Стресс и условия содержания

Собаки этой породы славятся высокой эмоциональностью и остро реагируют на изменения в обстановке. Смена места, появление нового члена семьи, сильные звуки или разлука с хозяином способны оказаться причиной к развитию облысения.

Тесное содержание, нехватка физической активности и редкие выгул вызывают хронический эмоциональный стресс. Тело отвечает на напряжение выделением кортизола, что сбивает функционирование волосяных фолликулов.

1. Обеспечьте питомцу стабильный распорядок дня
2. Создайте спокойную обстановку без громких звуков
3. Уделяйте время играм и прогулкам
4. Постепенно приучайте собаку к изменениям в жизни

Диагностика причины облысения

Чтобы верно установить фактора выпадения шерсти ветеринар проводит комплексное обследование. Оно включает осмотр эпидермиса, сбор анамнестических данных, лабораторные и инструментальные методы.

Метод диагностикиЧто выявляетОсмотр и дерматоскопияСостояние кожи и фолликуловСоскоб кожиКлещи и паразитарные заболеванияАнализ кровиГормональный фон и обмен веществБиохимия кровиРаботу внутренних органовЦитологияВоспалительные процессыПосев на грибкиГрибковые инфекции

Лишь по завершении получения всех данных врач сможет поставить диагноз и выбрать корректное лечение. Самостоятельное определение нередко приводит к запущенным стадиям заболевания.

Что делать владельцу при обнаружении залысин

При первых симптомах алопеции стоит обратиться к ветеринару и не заниматься самолечением. Не применяйте на кожу питомца средства без назначения специалиста.

- Запишитесь на приём к ветеринарному врачу
- Соберите информацию о рационе и изменениях в жизни питомца
- Не применяйте лекарственные средства без консультации
- Обеспечьте спокойную обстановку и качественный уход
- Следуйте рекомендациям специалиста по лечению

Ветврач определит причину потери шубки и разработает персональный план терапии. Лечение может содержать коррекцию рациона, медикаментозные средства, физиотерапию и постоянный контроль самочувствия питомца.

Заключение

Облысение у шпица ни в коем случае не может быть без внимания. Чем быстрее вы придёте к ветеринару, тем больше шансы на благоприятное восстановление шубки.

Часто задаваемые вопросы

Отчего у шпица образовались залысины?

Причин существует много: гормональные нарушения, кожные паразиты, аллергические реакции, стресс и неправильное питание. Верный диагноз установит специалист по результатам диагностики.

Как отличить линьку от алопеции?

При естественной [заказать вызов врача из ветклиники](#) линьке покров выпадает равномерно и не оставляет залысин. При алопеции [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) возникают местные проплешины, нередко идущие вместе с зудом и воспалением.

Способен ли патологическое облысение исчезнуть самостоятельно?

В ряде ситуаций при удалении фактора (например, эмоционального стресса или неправильного корма) шерсть способна восстановиться без лечения. Однако при гормональных и паразитарных заболеваниях требуется терапия.

Какие анализы нужно сдать питомцу?

Обычно специалист рекомендует соскоб, анализ крови на гормоны, биохимию, цитологическое исследование и посев на грибковые инфекции. Перечень зависит от симптомов.

Способна ли потеря шерсти оказаться опасной для человека?

Если причина алопеции — грибковая инфекция (к примеру, лишай), она может передаваться на человека. В прочих случаях облысение не является опасности для людей.

Через сколько количество времени шерсть восстанавливается после лечения?

Сроки зависят от причины и степени серьёзности проблемы. При простых ситуациях шубка восстанавливается за один-два месяца, при сложных заболеваниях может занять более времени.